

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
Н.А. ВЛАСОВ
11.01.2017

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Даны® Спот-он для борьбы
с эктопаразитами плотоядных животных
(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 117437, г. Москва,
ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Даны® Спот-он (Dana Spot-on). Международное непатентованное наименование действующего вещества: фипронил.
 2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.
Дана® Спот-он содержит в 1 мл в качестве действующего вещества фипронил – 50 мг и вспомогательные вещества: спирт изопропиловый, диметилформамид, кислоту лимонную и полиэтиленгликоль.
 3. По внешнему виду раствор представляет собой маслянистую опалесцирующую жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета.
- Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.
- Запрещается применение Даны® Спот-он по истечении срока годности.
4. Выпускают препарат по 0,5; 1,0; 1,5 мл в металлополимерных пипетках или по 15 мл в полимерных флаконах с крышками - капельницами. Пипетки одного объема по 2 или 4 штуки, флаконы-капельницы поштучно, упакованы в картонные пачки в комплекте с инструкцией по применению.
 5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 25°C.
 6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
 7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
 8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Даны® Спот-он относится к инсектоакарицидным препаратам группы фенилпирозолов.
Фипронил, входящий в состав лекарственного препарата, обладает выраженной инсектоакарицидной активностью в отношении преимагинальных и имагинальных фаз развития блох (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), вшей (*Linognathus setosus*), власоедов (*Trichodectes canis*), саркоптоидных (*Sarcoptes canis*, *Sarcoptes vulpis*, *Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*, *Psoroptes cuniculi*), иксодовых (*Ixodes ricinus*, *Ixodes scapularis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Dermacentor variabilis*) и демодекозных (*Demodex spp.*) клещей.

10. Механизм действия фипронила заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели насекомых и клещей.

После нанесения препарата на кожу фипронил, практически не всасываясь в системный кровоток, распространяется по кожно-волосистому покрову животного, накапливается в эпидермисе, волосистых луковицах и сальных железах, оказывая контактное инсектоакарицидное действие, которое проявляется через 12-24 часа и продолжается на протяжении 4-6 недель после однократной обработки животного.

Дана® Спот-он по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего, кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, пчел, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Дана® Спот-он назначают собакам и кошкам с 12-недельного возраста для лечения и профилактики энтомозов, вызываемых блохами, вшами и власоедами, акарозов, вызываемых саркоптоидными, иксодовыми и демодекозными клещами, пушным зверям – для лечения и профилактики отодектоза.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная непереносимость компонентов препарата, в том числе в анамнезе. Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями и выздоравливающие животные, собаки массой менее 2 кг. Не допускается аурикулярное применение препарата (при ушной чесотке) при прободении барабанной перепонки.

13. Дана® Спот-он для лечения и профилактики энтомозов, а также защиты собак и кошек от нападения иксодовых клещей применяют животным однократно путем капельного нанесения («spot-on») на сухую неповрежденную кожу в места, недоступные для слизывания (область спины между лопатками или область шеи у основания черепа), выбирая пипетку необходимого объема с учетом вида и массы обрабатываемого животного в дозах, указанных в таблице:

Таблица

Наименование препарата	Объем препарата на животное, мл	Количество пипеток и номинальный объем на одну обработку
Дана® Спот-он для щенков и собак от 2 кг до 10 кг	1,5 мл	1 пипетка по 1,5 мл
Дана® Спот-он для щенков и собак от 10 кг до 20 кг	3 мл	2 пипетки по 1,5 мл
Дана® Спот-он для щенков и собак от 20 кг до 40 кг	4,5 мл	3 пипетки по 1,5 мл
Дана® Спот-он для собак более 40 кг	6 мл	4 пипетки по 1,5 мл
Дана® Спот-он для котят и кошек до 3 кг	0,5 мл	1 пипетка по 0,5 мл
Дана® Спот-он для кошек более 3 кг	1,0 мл	1 пипетка по 1,0 мл

Повторные обработки животных в сезон наибольшей активности паразитов проводят по показаниям, но не чаще одного раза в месяц, при частом мытье животного с моющим средством (более 2 раз в месяц) – не чаще 1 раза в 2 недели.

В целях предотвращения повторной инвазии блохами животным заменяют подстилки или обрабатывают их разрешенным к использованию инсектицидным препаратом в соответствии с инструкцией по применению.

Акарицидное действие фипронила начинается спустя 24 часа после нанесения препарата, в связи с этим обработки следует проводить не позднее, чем за сутки до предполагаемого выгула животного в местах возможного обитания клещей (парки, скверы, лес).

Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного препарат в количестве 1-2 капель наносят на клеша и место его прикрепления к коже. Если в течение 20-30 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают из тела и уничтожают.

Для лечения собак, кошек и пушных зверей при отодектозе (ушной чесотке) наружный слуховой проход очищают от струпьев и корок, затем закапывают в каждое ухо по 3-5 капель препарата, ушную раковину складывают вдоль пополам и массируют ее основание. Обработку повторяют 2-3 раза с интервалом 5-7 дней. При необходимости курс лечения повторяют.

Лекарственный препарат обязательно вводят в оба уха, даже в случае выявления клинических признаков заболевания только в одном ухе.

При поражении собак и кошек саркоптозом, нотоэдрозом или демодекозом препарат наносят тонким слоем на предварительно очищенные от струпьев пораженные участки тела тампоном от периферии к центру с захватом пограничной здоровой кожи до 1 см, в дозах, указанных в таблице. При тяжелом течении заболевания лечение животного рекомендуется проводить комплексно с применением патогенетических и симптоматических лекарственных средств. Обработку проводят 3-5 раз с интервалом 7-10 суток до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами акарологических исследований.

Животных с обширными участками поражения обрабатывают в два приема с интервалом 1 день, нанося препарат сначала на одну, а затем на другую половину пораженной поверхности тела.

Для предотвращения слизыивания препарата животным надевают шейный воротник, намордник или смыкают челюсти петлей из тесьмы, которые снимают через 20-30 минут после нанесения препарата.

Не следует наносить препарат на влажную и/или поврежденную кожу, купать животное в открытых водоемах, а также мыть с моющим средством в течение 48 часов после обработки.

14. При передозировке препарата у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.

15. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Беременным и лактирующим самкам Дана[®] Спот-он при необходимости применяют под контролем ветеринарного врача. Не подлежат обработке препаратом котята и щенки моложе 12-недельного возраста.

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки следует ее провести как можно скорее, в той же дозе.

18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У некоторых животных при индивидуальной повышенной чувствительности и появлении признаков раздражения кожи и аллергических реакций, препарат следует смыть водой с моющим средством и при необходимости провести десенсибилизирующую терапию.

19. Дана[®] Спот-он не следует применять совместно с другими инсектоакарицидными лекарственными препаратами для обработки животных.

20. Препарат не предназначен для обработки продуктивных животных.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Дана® Спот-он следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Дана® Спот-он следует использовать резиновые перчатки. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. Пустые пипетки и флаконы из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей; их помещают в целлофановый пакет и утилизируют с бытовыми отходами. Не следует гладить и допускать контакта детей с обработанными животными в течение 24 часов после нанесения препарата. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата необходимо избегать прямого контакта с Дана® Спот-он.

23. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Дана® Спот-он, утвержденная Россельхознадзором 16 августа 2016 года.

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-2112-2356 N17ВР-3-2.1/00684