

СОГЛАСОВАНО

Директор ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов»
(ФГБУ ВНИКМ) председатель ТК 454

А. Н. Панин

« 2011 г

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Санофлай для защиты крупного рогатого скота, лошадей и собак от двукрылых насекомых, блох и клещей.

(Организация-разработчик ООО «Апи-Сан», г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование препарата: Санофлай (Sanofly).

Международное непатентованное наименование действующего вещества: цифлутрин.

2. Лекарственная форма: раствора для наружного применения.

Санофлай в качестве действующего вещества в 1 мл содержит 10 мг цифлутрина, а также вспомогательные вещества: ДМСО - 50 мг, поливинилпирролидон – 20 мг, изопропиловый спирт – 50мг, сорбитан олеат – 10 мг, ПЭГ – до 1 мл.

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета.

3. Препарат расфасовывают по 10 мл, 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл и 1000 мл в полимерные флаконы с дозатором, по 5000 мл в полимерные канистры с завинчивающимися крышками и в полимерных пипетках по 0,5 мл, 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл, и 5 мл.

Срок годности при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.

Запрещается применение Санофлай по истечении срока годности.

4. Хранят препарат в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 8°C - 25 °C.

5. Санофлай следует хранить в местах недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Санофлай обладает контактным инсектицидным и репеллентным действием в отношении насекомых и паукобразных (мух, мошек, оводов, комаров, слепней, блох, вшей, власоедов, иксодовых клещей). Цифлутрин, входящий в состав препарата, относится к группе синтетических пиретроидов, механизм действия которых заключается в блокировании

передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель насекомых и клещей.

После нанесения на кожу препарат распределяется по поверхности тела, в незначительной степени резорбируется кожей, что обеспечивает его длительное инсектоакарицидное и репеллентное действие.

Санофлай по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76): в рекомендуемой дозе не оказывает резорбтивно-токсического, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного, иммунотоксического и местнораздражающего действия на кожу; при попадании в глаза вызывает слабое раздражение; токсичен для рыб и пчел.

III. Порядок применения

8. Санофлай применяют для обработки крупного рогатого скота в пастбищный период, лошадей в период активного лета насекомых, в целях уничтожения зоофильных мух, слепней, оводов, комаров и мошек и защиты животных от их нападения. А также для профилактики нападения и лечения заболеваний, вызываемых двукрылыми насекомыми, клещами и блохами у собак. Защитное действие препарата продолжается не менее 28 дней после однократной обработки.

9. Препарат не следует наносить на влажную, поврежденную и загрязненную кожу. Не следует применять препарат щенкам моложе 4-6 недельного возраста и самкам в первой половине беременности.

10. Перед массовой обработкой поголовья каждую серию Санофлай следует испытать на небольшой группе животных. При отсутствии осложнений в течение суток приступают к обработке всего поголовья. Крупному рогатому скоту и лошадям Санофлай наносят на кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца, в дозе 0,3 мл на 10 кг массы животного. При локализованном применении возможны ожоги. Обработку животных проводят в пастбищный период один раз в 4-6 недель, в зависимости от численности насекомых. Дойных коров следует обрабатывать сразу после дойки.

Собак следует обрабатывать в период активности насекомых и клещей, препарат наносят в область холки, раздвинув шерсть, непосредственно на кожу животного в следующих дозах:

Масса животного, кг	Объем препарата, мл
Менее 5	0,5
5-10	1
10-20	2
20-30	3
30-40	4
40 и более	5

11. При передозировке у животных возможны: угнетение, самопроходящее слюнотечение.

12. У животных при первом применении и отмене препарата возможны гиперсаливация, проходящая самостоятельно без применения лекарственных средств.

13. В случае пропуска очередной обработки, применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. При применении Санофлай в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны: угнетение, повышенная возбудимость, гиперемия и болезненность в месте обработки.

15. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: не рекомендуется применение препарата с другими синтетическими перитроидами.

16. Продукцию животноводства после применения Санофлай в соответствии с настоящей инструкцией разрешается использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с препаратом Санофлай следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. Обработку животных следует проводить использованием в спецодежды (халат, головной убор, резиновые сапоги, гигиенические перчатки).

По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Санофлай следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

Инструкция разработана ООО «АПИ-САН»; 117437, г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 3/1, кв. 222.

Номер регистрационного удостоверения:

Генеральный директор
ООО «АПИ-САН»



А.А.Смирнов