

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

  
E.A. НЕПОКЛОНОВ  
31 АВГ 2015

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Стоп-Интим® таблеток для кошек  
для регуляции половой охоты  
(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 117437, г. Москва,  
ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Стоп-Интим®  
таблетки для кошек (Stop-Intim tabulet for cat).

Международное непатентованное наименование: мегестрол.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Стоп-Интим® таблетки для кошек содержат в одной таблетке в качестве действующего вещества мегестрола ацетат – 5 мг, а также вспомогательные компоненты: Na-карбоксиметилцеллюлозу, лактозу, кальций стеариновокислый, примогель и коллидон.

3. По внешнему виду препарат представляет собой плоские таблетки круглой формы, белого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается применять Стоп-Интим® таблетки для кошек по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают по 12 и 15 таблеток в полимерных флаконах. Каждую единицу первичной упаковки в комплекте с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °C до 25 °C.

6. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические свойства

9. Стоп-Интим® таблетки для кошек относятся к гормональным

лекарственным препаратам.

10. Мегестрола ацетат, входящий в состав препарата, представляет собой синтетическое производное гормона прогестагена, обладает свойством ингибировать секрецию лутеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, которые вырабатываются передней долей гипофиза. При использовании препарата до начала эструса (течки) происходит угнетение синтеза эстрогенов фолликулами яичников, что предотвращает развитие морфологических и психофизиологических изменений у самок, связанных с половым циклом. При применении препарата самкам на 2 или 3 день от начала эструса происходит прерывание течки.

У самцов мегестрола ацетат снижает уровень тестостерона в крови и оказывает опосредованное влияние на регуляцию полового поведения и связанные с ней поведенческие реакции, снижая агрессию, беспокойство и повышенную возбудимость у животного.

Мегестрола ацетат легко адсорбируется в кишечнике, биотрансформируется в печени и выводится из организма в виде солей с мочой в течение 1-2 суток.

Стоп-Интим® таблетки для кошек по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают гепатотоксического, мутагенного и сенсибилизирующего действия.

### III. Порядок применения

11. Стоп-Интим® таблетки для кошек назначают для регуляции половой охоты у кошек, в том числе для задержки и прерывания течки у самок кошек, снижения половой активности и коррекция поведения у котов.

12. Противопоказанием к применению Стоп-Интим® таблеток для кошек является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), заболевания мочеполовой системы, опухоли и диабет.

13. Стоп-Интим® таблетки для кошек вводят перорально, принудительно на корень языка, за 1-2 часа до кормления, с учетом показаний и пола животного.

С целью задержки течки кошкам препарат применяют в период между течками один раз в неделю в дозе ½ таблетки или один раз в две недели в дозе 1 таблетка (5 мг по ДВ).

Курс применения – не более 18 месяцев. Повторение курса возможно после проявления у кошки нормального физиологического цикла.

С целью прерывания течки кошкам препарат применяют при появлении ее первых признаков (но не позже чем через 3 дня от ее начала) в дозе 1 таблетка (5 мг по ДВ) на животное в день 5-7 раз с интервалом 24 часа (до исчезновения признаков течки плюс один день).

Котам для снижения полового возбуждения и коррекции поведения препарат применяют в дозе 1 таблетка (5 мг по ДВ) на животное. Первые 7 дней лекарственное средство дают ежедневно в суточной дозе, последующие 14 дней – ½ суточной дозы.

14. Симптомы передозировки у животных не выявлены.
15. При первом применении лекарственного препарата у животного могут наблюдаться гиперсаливация и повышенный аппетит.
16. Не следует применять препарат неполовозрелым животным, беременным и лактирующим самкам.
17. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.
18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У отдельных животных при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата или при его длительном применении возможны обильное слюнотечение, раздражение кожи, рвота, изменение аппетита, поведенческих реакций и увеличение молочных желез. В этих случаях применение препарата следует прекратить и при необходимости назначить симптоматические средства.
19. Стоп-Интим<sup>®</sup> таблетки для кошек совместимы с другими лекарственными препаратами, кормами и кормовыми добавками. Не рекомендуется совместное длительное применение Стоп-Интим<sup>®</sup> таблеток для кошек с кортикоステроидами.
20. Стоп-Интим<sup>®</sup> таблетки для кошек не предназначены для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе со Стоп-Интим<sup>®</sup> таблетками для кошек следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.
22. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.
23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта со Стоп-Интим<sup>®</sup> таблетками для кошек. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной владельцем  
регистрационного удостоверения  
лекарственного препарата на принятие  
претензий от потребителя.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская  
область, Балашихинский район,  
Полтевское шоссе, владение 4.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по  
применению Стоп – Интим таблетки для кошек, утвержденная  
Россельхознадзором 09 июня 2011 года.

Номер регистрационного удостоверения

77-3-7.15-2765 № ПВР-3-6.0/02579

Генеральный директор  
ООО «АПИ-САН»



А.А. Смирнов